

Mon épouse ne sait plus se maquiller

Je n'arrive plus à enfiler un pull

Elle est plus maladroite


En participant à un jeu de mimes avec mon fils, mon mari n'a pas réussi à faire semblant de remplir un verre d'eau

Je ne sais plus utiliser mon rasoir

Désormais, je dois aider mon mari pour monter un meuble en kit

Maintenant, j'avale souvent de travers

Les apraxies sont caractérisées par l'incapacité à réaliser des mouvements déjà appris, sans déficit moteur, sensoriel ou de compréhension.



Mon épouse ne sait plus se maquiller

Je n'arrive plus à enfiler un pull

Elle est plus maladroite

En participant à un jeu de mimes avec mon fils, mon mari n'a pas réussi à faire semblant de remplir un verre d'eau

Je ne sais plus utiliser mon rasoir

Désormais, je dois aider mon mari pour monter un meuble en kit

Maintenant, j'avale souvent de travers

Les apraxies sont caractérisées par l'incapacité à réaliser des mouvements déjà appris, sans déficit moteur, sensoriel ou de compréhension.

Les apraxies entraînent des difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne et peuvent impacter la vie personnelle et/ou la vie professionnelle.

Dans chacune des situations, favoriser un environnement calme, esquivé les distractions.

Symptômes	Manifestations après l'AVC	Quelques astuces pour faire face
Apraxie idéatoire Altère la manipulation d'objets courants	Difficultés à utiliser une brosse à dents, une brosse à cheveux, un rasoir, une fourchette...	Prévoir du matériel adapté (brosse à dent électrique, couvert à manche adapté...)
Apraxie motrice Trouble de la dextérité (gestes précis et rapides)	Difficultés à mettre du rouge à lèvres, utiliser un clavier d'ordinateur...	Prévoir du matériel adapté (dictée vocale...)
Apraxie d'habillage Difficultés à s'habiller	Difficultés à lacer ses chaussures, mettre ses vêtements...	Adapter les habits (pantalon à élastique, chaussures velcro...)
Apraxie visuo-constructive Difficultés à définir les relations entre objets dans l'espace	Difficultés à assembler différentes parties d'un ensemble (bricolage...) Difficultés à dessiner	Procéder étape par étape
Apraxie bucco-faciale Trouble des gestes du visage, de la bouche, du larynx	Difficultés à siffler, souffler, faire un bisou, tirer la langue, avaler...	Aider en proposant un geste de substitution (accolade...)
Apraxie idéo-motrice Difficultés à imiter un geste simple et/ou difficultés à réaliser les gestes symboliques	Perplexité face au geste demandé Difficultés à faire un signe pour saluer une personne, applaudir...	Expliquer au patient ses difficultés

• **Où s'adresser pour un diagnostic et une prise en charge adaptés ?**

Les changements cognitifs, comportementaux et émotionnels, j'en parle avec mon médecin traitant pour être orienté vers les professionnels inscrits dans la filière de soins des accidents vasculaires cérébraux :

- Consultations pluri-professionnelles post-AVC
- Consultations mémoire
- Toutes les coordonnées sont publiées sur :

Les apraxies entraînent des difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne et peuvent impacter la vie personnelle et/ou la vie professionnelle.

Dans chacune des situations, favoriser un environnement calme, esquivé les distractions.

Symptômes	Manifestations après l'AVC	Quelques astuces pour faire face
Apraxie idéatoire Altère la manipulation d'objets courants	Difficultés à utiliser une brosse à dents, une brosse à cheveux, un rasoir, une fourchette...	Prévoir du matériel adapté (brosse à dent électrique, couvert à manche adapté...)
Apraxie motrice Trouble de la dextérité (gestes précis et rapides)	Difficultés à mettre du rouge à lèvres, utiliser un clavier d'ordinateur...	Prévoir du matériel adapté (dictée vocale...)
Apraxie d'habillage Difficultés à s'habiller	Difficultés à lacer ses chaussures, mettre ses vêtements...	Adapter les habits (pantalon à élastique, chaussures velcro...)
Apraxie visuo-constructive Difficultés à définir les relations entre objets dans l'espace	Difficultés à assembler différentes parties d'un ensemble (bricolage...) Difficultés à dessiner	Procéder étape par étape
Apraxie bucco-faciale Trouble des gestes du visage, de la bouche, du larynx	Difficultés à siffler, souffler, faire un bisou, tirer la langue, avaler...	Aider en proposant un geste de substitution (accolade...)
Apraxie idéo-motrice Difficultés à imiter un geste simple et/ou difficultés à réaliser les gestes symboliques	Perplexité face au geste demandé Difficultés à faire un signe pour saluer une personne, applaudir...	Expliquer au patient ses difficultés

• **Où s'adresser pour un diagnostic et une prise en charge adaptés ?**

Les changements cognitifs, comportementaux et émotionnels, j'en parle avec mon médecin traitant pour être orienté vers les professionnels inscrits dans la filière de soins des accidents vasculaires cérébraux :

- Consultations pluri-professionnelles post-AVC
- Consultations mémoire
- Toutes les coordonnées sont publiées sur :